

# NEOMERCUCROMO soluzione cutanea

## Eosina/ Cloroxilenolo/ Propilenglicole

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. *Vedere paragrafo 4.*
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è NEOMERCUCROMO e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare NEOMERCUCROMO
3. Come usare NEOMERCUCROMO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NEOMERCUCROMO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è NEOMERCUCROMO e a che cosa serve**

NEOMERCUCROMO è un prodotto a base di eosina, cloroxilenolo e propilenglicole usato nel trattamento locale disinfettante di ferite, abrasioni, scottature, decubiti e piaghe in genere. Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare NEOMERCUCROMO**

##### **Non usi NEOMERCUCROMO**

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (*elencati al paragrafo 6*).

##### **Avvertenze e precauzioni**

- Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso cutaneo (locale) può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reazione dell'organismo a sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso **interrompere il trattamento** e consultare il medico per iniziare una terapia adatta.
- Il prodotto è solo per uso esterno.
- L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta mortali. **In caso di ingestione accidentale consultare immediatamente un medico.**
- Evitare il contatto con gli occhi.

Lascia sugli indumenti macchie difficilmente eliminabili.

##### **Altri medicinali e NEOMERCUCROMO**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Evitare l'uso contemporaneo di altri disinfettanti e detergenti.

##### **NEOMERCUCROMO con cibi, bevande e alcol**

Non sono note interazioni.

##### **Gravidanza e allattamento**

Il medicinale può essere usato durante la gravidanza. Se ha dei dubbi, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare il medicinale.

Se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

##### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non interferisce.

## **Il contenitore di NEOMERCUCROMO contiene gomma latex**

Il contenitore di questo medicinale è costituito di gomma latex. Può causare gravi reazioni allergiche.

### **3. Come usare NEOMERCUCROMO**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico, o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applicare 1 - 2 volte al giorno alcune gocce di soluzione cutanea sulla parte lesa; coprire eventualmente con un bendaggio appropriato sterile asciutto.

Non superare le dosi consigliate.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di bruciore o irritazione (intolleranza), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Per applicazioni ripetute o in seguito a bendaggio che non permette la traspirazione della parte trattata, si possono avere infiammazioni della cute (reazioni eczematose). L'uso del medicinale può dare luogo a fenomeni di sensibilità al sole e ai raggi UV (fotosensibilizzazione).

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare NEOMERCUCROMO**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Tenere il flacone ben chiuso, lontano da fonti di calore.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene NEOMERCUCROMO**

- I principi attivi contenuti in 100 ml di soluzione cutanea sono:  
Eosina 2,0 g; Cloroxilenolo 0,3 g; Propilenglicole 30,0 g.
- Gli altri componenti sono: etanolo 95°; sodio edetato; acido acetico (correttore pH); acqua depurata.

#### **Descrizione dell'aspetto di NEOMERCUCROMO e contenuto della confezione**

NEOMERCUCROMO si presenta come soluzione cutanea, 1 flacone da 50 ml con contagocce in vetro.

Il medicinale è disponibile anche in confezione da 2 flaconi da 10 ml con contagocce di plastica a beccuccio.

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 12 febbraio 2017**



Laboratorio  
Farmaceutico